QK
316
.P47
1854x
v.2

FLORA

DELL'ITALIA SETTENTRIONALE

E DEL

TIROLO MERIDIONALE

RAPPRESENTATA COLLA FISIOTIPIA

DAI FRATELLI

Dott. CARLO e AGOSTINO PERINI

Centuria Seconda

TRENTO
Tipografia Perini

ARNOLD
ARBORETUM
HARVARD
UNIVERSITY

34523
May 4, 1923

ARNOLD
ARBORETUM
HARVARD
UNIVERSITY

Achillea Millefolium L.

Erba pennina, Sanguinella, Millefoglio

Zona delle valli e collina. — **Località,** prati ed incolti. — **Provenienza,** comune in tutto il Trentino e in tutta l'Italia settentrionale. — **Uso,** questa pianta una volta si commendava per le sue proprietà toniche, e fu suggerita a guarigione dell'ipocondria, delle emorroidi e delle ferite.

ARNOLD ARBORETUM HARVARD UNIVERSITY

ARNOLD
ARBORETUM
HARVARD
UNIVERSITY

Aethionema saxatile R. Brow.

Thlaspi saxatile L.

Tlaspi carnicino

Zona collina e montana. — **Località**, ghiaiosi e petrosi, suolo dolomitico o franoso calcareo. — **Provenienza**, dietro le ghiaie del Convento alle Laste, e alla Vela presso Trento, sull' apertura di Val d' Ampola verso Storo, alla base del Baldo, nelle vicinanze di Rovereto, in Valsugana presso Grigno e nelle Giudicarie: fu trovato sul Nizzardo, e nei ghiaiosi delle alpi piemontesi, a Bormio in Valtellina, sulle mura di Padova, nell' Insubria svizzera presso Lugano, sul Bassanase in Valstagna, pianta sparsa qua e là nell' alta Italia ma non comune.

Dodecand

Zona delle v
e Rovereto, ne

Agrimonia Eupatorium L.

Fraga selvatica, Agrimonia

Zona delle valli e collina. — **Località,** margine dei campi, aridi e incolti. — **Provenienza,** sparsa su tutti i colli adiacenti a Trento e Rovereto, nella Naunia, Valsugana e Giudicarie, ed è comune in tutta l'Italia settentrionale. — **Uso,** le sue foglie e radici hanno un sapore astringente, e vengono usate in decozione per gargarismi detersivi.

Tetrandria monogynia

Sanguisorbeae

Alchemilla pubescens M. B.

Alchemilla pelosa

Zona subalpina — **Località,** prati. — **Provenienza,** erbosi di Bondone, di Sardagna, prati di Gazza, di Folgaria e di Sella; non deve esser rara sui gioghi del Piemonte e sulle montagne dell'alta Italia, e se qualche autore non l'accenna è perchè non la distinse dall' *Alchemilla vulgaris L.*

Alnus viridis D. C. fl.

Betula ovata Schra. B. Alnobetula Ehrh. Betula viridis Chaix.

Ontano verde-chiaro

Zona subalpina e alpina. — **Località,** surroga il *Pinus Pumilio Haenk* nelle formazioni calcaree. — **Provenienza,** alla base del Cornetto di Bondone, sul Col Santo, sul Baldo, nelle selve di Malcesine, sui monti di Bolca, Alba e Gramulone, nè manca sulle giogaie di tutta l'alta Italia.

Alnus glutinosa Gaertn

Betula Alnus a glandulosa L.

Alno, Ontano, Onizzo

Zona delle valli. — **Località,** margine delle fosse e copioso presso le acque stagnanti. — **Provenienza,** frequente nei luoghi sabbionosi e umidi lungo l' Adige, ed è comune in tutta l' alta Italia.

Alissum calycinum L.

Adyseton calycinum Scop.

Clipeola calicina

Zona collina. — **Località,** ghiaiosi e petrosi. — **Provenienza,** comune fra le frane dei rivi e torrenti e sui colli aridi e soleggiati del Trentino e di tutta l'Italia settentrionale.

Alsine rostrata Koch.

Sabulina rostrata Reich. fl. Arenaria rostrata Pers. A. fastigiata Smith.

Renaiola a capolini

Zona alpina e subalpina. — **Località,** sulle roccie e nei fessi delle rupi. — **Provenienza,** sui gioghi di Pinè, nelle vicinanze di Bormio, fu trovata sulle rupi presso Susa nel Piemonte, sul Cenisio, a Castel Baradello presso Como, e nelle vicinanze del Cismone presso al Canal del Brenta.

Alsine recurva Wahlen.

Arenaria recurva All.

Renaiola falcata

Zona nivale e alpina. — **Località,** ghiaiosi. — **Provenienza,** alture di Paneveggio, Primiero, Fierozzo, Spinale, Giudicarie e Valsugana: è più comune sulle formazioni cristallizzate, se l'accenna pur anco sulle alpi delle Vieussene nella Liguria Occidentale, alla Madonna delle Finestre in Piemonte, sulle alpi di Vaudier, sul S. Bernardo, al sommo del Madone in Val Vegezzo, e sul Legnone al Lario.

Zona alp
t si diffon
Valtel

Anemone alpina L.

Anemolo d'Alpe

Zona alpina e subalpina. — **Località,** prati e pascoli. — **Provenienza,** comune nelle alture calcaree del bacino di Trento e Rovereto, e si diffonde nelle stesse posizioni ed alla medesima zona nelle valli adiacenti, abita pure i pascoli delle alpi Valderie, del Cenisio, della Valtellina, dei gioghi al Lario, fu trovato sul monte Muffetto nel Bresciano, in val Taeggio sul Bergamasco e alla Grappa sul Bassanese.

Polyan

Zona co
Trentino

Anemone Hepatica L.

Hepatica triloba D. C.

Erba trinità, Trifoglio epatico, Fegatella

Zona collina e montana. — **Località,** umidi ombrosi, boschetti cedui, costante a settentrione. — **Provenienza,** comune in tutto il Trentino e nell' Italia settentrionale. — **Uso,** per le sue qualità astringenti fu amministrata allo scopo di invigorire i visceri, ora è fuor d'uso.

Anemone narcissiflora L.

Anemone a fior di Narciso

Zona nivale. — **Località,** pascoli. — **Provenienza,** alture del Pavione, della Lanciada, dell' Alpe Gavardina in Val di S. Giovanni nelle Giudicarie; fu colta sui gioghi della Madonna delle Finestre in Piemonte, sul monte Generoso al Lario, alla Grappa nel Bassanese e sulle alture del Friuli.

Anthemis arvensis L.

Camomilla bastarda

Zona delle valli. — **Località,** campi. — **Provenienza,** diffusa tra i solchi de'nostri campi e sparsa in tutta l' alta Italia.

Anthoxanthum odoratum L.

Paleo, Paleino odoroso

Zona delle valli e collina. — **Località,** prati e incolti aridi. — **Provenienza,** frequente tanto al colle come al piano su tutto il Trentino, non che nell'Italia settentrionale. — **Uso,** somministra il miglior fieno.

Aronia rotundifolia Pers.

Mespilus Amelanchier L. Pyrus Amelanchier Willd.

Pero cervino

Zona collina e montana. — **Località,** declivi de' monti e fessure delle rupi, sui greppi sporgenti. — **Provenienza,** famigliare su tutti i colli del bacino di Trento e Rovereto, non che nelle valli adiacenti ; alligna eziandio sul Bassanese presso Angarano, Campese e Solagna, vicino a Sondrio, ai Corni di Canzo al Lario, sul monte Tondo presso Verona, nella selva Mantica e finalmente in Piemonte sulle alpi Valderie. — **Uso,** i frutti di questo fruttice sono saporosi e graditi allo stomaco.

Astragalus monspessulanus L.

Vecciarino rosato

Zona collina e montana. — **Località,** aridi e graminosi; suolo argilloso. — **Provenienza,** alla base del monte Peller e alla Rocchetta nella Naunia, presso Stenico e sul Limarò; nella valle del Sarca presso S. Massenza, sui colli del Garda; abbonda pure sui colli arsicci della Liguria, alle falde del Cenisio, presso Nizza, sul Sempione italico e sul monte di Griante al Lario.

Pentan

Zona suba
la cuta anch

Astrantia maior L.

Astranzia maggiore

Zona subalpina. — **Località,** prati. — **Provenienza,** erbosi di Bondone, di Povo, del Baldo, comune nei prati alpini del Trentino; fu colta anche nella Liguria occidentale presso Gaudebella, sul Cenisio alla Novalese, sul monte di Pusiana sul Comasco a Carnico e Serina alta nel Comasco. — **Uso,** si coltiva negli orti qual pianta d'ornamento.

Zona

Bonjeania hirsuta Rchb.

Lotus hirsutus L. Doryjchnium hirsutum D. C.

Erba velia, Piè di gallo, Tignamica salvatica

Zona collina e montana. — **Località,** ghiaiosi e sterili. — **Provenienza,** presso Revò e Castel Brughiero nella Naunia, sul lido genovese alla Foce, pianta non rara nella bassa e media Italia, rarissima nell' Italia settentrionale.

Bupleurum stellatum L.

Bupleuro stellato

Zona nivale. — **Località,** pascoli aridi e petrosi. — **Provenienza,** Peio nella valle Ombrina e Fierozzo nella valle del Fersina, sulla Lanciada ed a Breguzzo nelle Giudicarie, e in Cima d' Asta; se lo segna sulle Alpi piemontesi, a Margozzolo sul Novarese, presso Airolo alle radici del Gotardo, nella Valtellina, sul monte Legnone al Lario, nel Bergamasco sul monte Barbellino, e sul Montalon nel Bassanese.

Calluna vulgaris Salisbury

Erica vulgaris L.

Crecchia, Brentoli, Erica, Scopa

Zona montana e subalpina. — **Località**, ombrosi e luoghi aprichi. — **Provenienza**, comune in tutta l'alta Italia.

Zona col

Campanula rapunculoides L.

Campanula serpeggiante

Zona collina. — **Località,** al lembo dei boschetti fra le siepi e al margine dei campi di colle. — **Provenienza,** comune presso le adiacenze di Povo e di S. Agata, fu pur trovata in Folgaria e nella valle di Fiemme non che sul Bassanese, il Pollini la segna comune sul Bresciano e sul Vicentino, Bertoloni la indica soltanto sul Trentino.

Zona de

Cardamine amara L.

Billeri amaro

Zona delle valli. — **Località,** margine dei rivi e siti umidi. — **Provenienza,** stagni della valle dell'Adige, in Pinè, in Fiemme, in Valsugana; abbonda al margine delle fosse del Veneto e del Lombardo.

Cardamine resedifolia L.

Billeri pennato

Zona alpina e subalpina. — **Località,** ghiaiosi umidi (suolo primitivo). — **Provenienza,** origini del Fersina, Pinè, Giudicarie, Val di Sole; pianta non molto comune nell' alta Italia; fu colta in Piemonte sui gioghi della Gardinera presso la Vernaria, e discende nel Parmigiano e sul Luchese.

Carex Oederi Retz

Zona montana. — **Località,** paludi. — **Provenienza,** al margine dei laghi di Pinè, presso il lago di Nambino in Rendena, prati alpini di Paneveggio, in Campogrosso e nelle valli di Breguzzo e d'Ampola.

Carex fuliginosa Schkuhr.

Carex frigida Walenb.

Carice fulginosa

Zona nivale. — **Località,** graminosi. — **Provenienza,** pianta rarissima, Koch la indica soltanto nel Salisburghese, nella Carniola e nel Tirolo, il Rota la raccolse presso il passo del Tonale, Elzmann la trovò nella Valle di Non ed allo Schlern.

Zona col

Carlina acaulis L.

Carlina bianca, Camaleone

Zona collina e montana. — **Località,** pendii aridi e pascoli magri — **Provenienza,** sulle coste snudate del monte Calispert, di S. Agata, e non rara a mezzo-monte in tutto il Trentino; gli autori la indicano volgare in tutti i monti dell'Italia boreale.

Zona
Rovere

Caucalis daucoides L.

Caucalis leptophylla Poll. Daucus platycarpos Scop.

Lappola carota

Zona collina. — **Località,** campi aridi. — **Provenienza,** Muralta, Zel, e lungo la base del Calispert, fu trovata nelle vicinanze di Rovereto, in Fiemme e nelle Giudicarie; se la accenna nei campi del Milanese, nelle adiacenze di Como, e nella Liguria orientale presso la villa Roppia.

Centaurea Cyanus L.

Battisecola, Fior d'aliso, Croce di S. Stefano

Zona collina e delle valli. — **Località,** seminati. — **Provenienza,** diffusa nei luoghi colti specialmente di colle si nel Trentino che in tutta l'Italia settentrionale.

Cirsium arvense Scop.

Serratula arvensis L.

Astone, Scardaccione, Strami, Stroppione

Zona delle valli. — **Località,** incolti umidi ed arenosi. — **Provenienza,** nei siti sabbionosi di Campo-Trentino, lungo le sponde dell'Adige, e fu trovato anche in Valsugana e presso Rovereto; è pianta infestante dei campi di tutta l'alta Italia.

Cirsium pannonicum Gaud.

Carduus pannonicus L. fil. Card. serratuloides Jacq. et Scop.

Cirsio pannonico

Zona montana e subalpina. — **Località,** ghiaiosi e petrosi. — **Provenienza,** s. Rocco, Povo sotto Chegul, presso Vigolo, fu trovato nelle Giudicarie presso Tione e al Garda; pianta non comune nel Trentino: l' Allioni la rinvenne nel Piemonte.

Colutea arborescens L.

Erba vesicaria o Sena falsa

Zona collina e montana. — **Località,** siepi e boschetti. — **Provenienza,** Sardagna, Piazzina, Ravina, Dos Trento, Valsugana, Val di Non, Giudicarie, rive del Garda, in genere comparisce qua e là nei boschetti dei colli trentini, trovasi ancora nel Friuli, lungo i lidi dell'Adriatico, sul Pavese e nel Piemonte. — **Uso,** fu surrogata all'erba Sena, ma per ottenerne un pari effetto conviene usarla a doppia dose.

Cornus sanguinea L.

Erba sanguinella, Sanguinello

Zona collina. — **Località,** siepi e boschetti. — **Provenienza,** fa parte dei cespugli che vestono i nostri colli e si frammette alle siepaie di tutta l'Italia settentrionale. — **Uso,** dalle bacche si estrae un olio ad uso di lampade come già notollo Matthioli, le verghe si prestano alla costruzione dei cesti, in genere tutte le parti di questa pianta sono venefiche per i sorci.

Dia

Zon

Coronilla varia L.

Erba ginestrina, Vecciarini

Zona, collina e delle valli. — **Località,** campi ed aridi. — **Provenienza,** comune sui colli e ne' luoghi colti del Trentino e di tutta l' Italia.

Zou

Coronilla Emerus L.

Colutea siliquata, Dondolino, Erba cornetta, Emero

Zona collina. — **Località,** pendii ombreggiati e petrosi. — **Provenienza,** pende dalla pareti dei colli di Trento ed è pianta popolare in Italia.

Zona coll
'Italia sett

Cynanchum Vincetoxicum R. Brow.

Asclepias Vincetoxicum L.

Bozzoli, Erba seta salvatica, Vincitossico

Zona collina. — **Località,** ombrosi e sassosi. — **Provenienza,** diffusa su tutti i colli specialmente calcarei del Trentino e di tutta l'Italia settentrionale. — **Uso,** una volta s'impiegava la radice e l'erba di questa pianta nel vaiuolo e nell'idrope per le sue qualità diuretiche ma ora è transandata.

Cytisus hirsutus L.

Cytisus hirsutus Scop. C. polytrichus M. B. C. falcatus W. K.! C. virgatus Vest!

Citiso bianco silvestre

Zona collina e montana. — **Località,** boschetti. — **Provenienza,** frequente sui colli di Gocciadoro e alla base dei monti adiacenti a Trento, al ponte di Stelle nelle Giudicarie, in Valsugana, nella selva d'Avio sul Baldo, nella Val di Rendena; fu anche visto alle radici degli Apennini, nelle siepi dell' Insubria in vicinanza dei paesi di Tromello e Alagna e sui colli e monti del Friuli e del Piemonte.

Zena
Trento
zodia

Cytisus alpinus Mill.

Avorniello alpino

Zona montana e subalpina. — **Località,** boschetti. — **Provenienza,** frequente nelle formazioni calcaree che circondano il bacino di Trento e s' intromette fra i boschetti di mezzo-monte, si propaga pur anche in Valsugana e Rendena, abbonda specialmente nelle selve della media Italia; se lo indica sui gioghi presso Genova *dei due fratelli*, sui monti di Cogia nel Ticinese, e nelle selve presso Bassano. — **Uso,** il legno si presta ai lavori di tornio.

Dia

Zona sub
Nevata

Cytisus radiatus Koch.

Spartium radiatum L. Genista radiata Scop.

Ginestra stellata

Zona subalpina. — **Località,** boschi cedui. — **Provenienza,** Marzola, Vigolana, Baldo, monti del Garda, Giudicarie e Rendena; fu pur trovata sull' Apennino ligure orientale a S. Stefano, nelle vicinanze del Lario a Grigne, in Valsassina e discende anche nell' Italia media.

Decendria

Zona
ondii s
di Buf

Dictamnus Fraxinella Pers.

Dittamo, Frassinello

Zona collina. — **Località,** aridi e boschetti. — **Provenienza,** abbonda sui colli di Fontanasanta, nei boschetti di Dos Trento, e sui pendii soleggiati presso Roveredo; abbellisce pure i colli di Genova, fu colta sul monte Groso nel Bassanese, nelle vicinanze del ponte di Buffalora a S. Martino e nelle selve d'Albino sul Bergamasco. — **Uso,** la sua radice fu apprezzata contro i vermi e l'epilessia, ora cadde in disuso.

Zon
abita

Dryas octopetala L.

Camedrio alpino, Camedrio cervino

Zona alpina. — **Località,** pascoli aridi. — **Provenienza,** Maranza, Baldo, Bondone, Gazza e sulle alture di Valsugana e delle Giudicarie; abita anche il Cenisio e le giogaie del Novarese sopra Finero nella Valveggezzo, fu raccolta sullo Spluga, in Valtellina, sul monte Codeno al Lario, e sulle montagne del Friuli.

Epilobium Dodonaei Vill.

Epilobium rosmarinifolium Haenke, E. angustissimum Ait.

Ramerino angustifolio, Camenerio

Zona, dalla collina alla glaciale. — **Località,** aridi e ghiaiosi. — **Provenienza,** presso Ponte alto e lungo gli argini bassi del Fersina, nei luoghi scagliosi ed arsicci d'Oltrecastello, presso Borgo, Rovereto, nelle Giudicarie e sul Montebaldo; fu pur trovato sul Cenisio, sul Gotardo, sul Braulio in Valtellina, ad Arengo sopra Livo nel Comasco e in Val Camonica sul giogo Bisgana.

Zona ec
si propaga

Erica carnea L.

Scopina

Zona collina e montana. — **Località,** nei siti aridi al margine dei boschi. — **Provenienza,** adorna il lembo dei boschetti di Gocciadoro, si propaga alla base del Calispert e di S. Agata; pianta in genere comune nelle valli basse del Trentino ed è comune in tutta l' alta Italia.

Eringium ametistinum L.

Calcatreppolo ametistino

Zona collina. — **Località,** aridi e incolti. — **Provenienza,** abbonda sui colli che circondano il bacino di Trento e Rovereto, cresce pure sul Veronese, ma in massima è molto raro nel rimanente dell' Italia settentrionale. Se lo accenna anche nei siti arsicci in vicinanza di Trieste.

Zona
adiacenti

Festuca ovina L.

Festuca duriuscula Bert.

Gramigna setaiola, Gram. pavonazza, Gram. fusaiola

Zona dalla collina alla nivale. — **Località,** sterili e pascoli aridi. — **Provenienza,** diffusa sui colli arsicci del Trentino e delle valli adiacenti; questa pianta però s' incontra più comune nei siti montuosi che nelle pianure; cresce nella Liguria occidentale sui monti della Scaggia, sui colli di Genova, sui monti vicini al Lario, e nei luoghi sterili di Trieste e dell' Istria.

Zona col

Fumaria officinalis L.

Erba acetina, Feccia, Fumosterno, Piè di gallo

Zona collina. — **Località,** popola il margine dei campi di colle, s'annida fra i fessi dei muri e delle rupi. — **Provenienza,** diffusa in sul Trentino e in tutta l'Italia settentrionale. — **Uso,** questa pianta s'impiega tuttora nelle purghe di primavera, e fu una volta apprezzata contro lo scorbuto, le artritidi e l'ipocondria, ma ora cadde in disuso.

Zona

Geum rivale L.

Caryophyllata rivalis Scop. C. aquatica Lmk.

Benedetta Cariofillata acquatica

Zona subalpina. — **Località** erbosi umidi, lungo i rigagnoli. — **Provenienza,** non rara sui monti calcarei che circondano il bacino di Trento e di Rovereto, e specialmente s'incontra sulla Marzola e Vigolana, fu trovato nella Liguria orientale nei prati umidi di Roncolungo, e nei luoghi umidi presso le terme Valderie in Piemonte, sul monte Generoso al Lario, e sull'Agro milanese.

Helleborus niger L.

Elleboro nero, Erba Nocca, Fava di lupo, Piè di diavolo

Zona montana. — **Località.** Vallarsa, sopra Cles, nelle Giudicarie lungo il rivo Ponale, sul monte Summano, sui monti del Friuli e del Nizzardo, nelle selve di Varallo e Vogogna sul Novarese, alle radici del monte S. Salvadore presso Lugano, alle bocche del Lario presso Bellaggio, ai Corni di Canzo, e sul Bassanese al monte Oro vicino a Grappa. — **Uso,** alle radici di sapor nauseoso ed amaro si ascrive la proprietà drastica ed antelmintica, e fu sempre apprezzata la stessa radice in tutte le malattie derivanti da sofferenze d' animo, quindi nell' ipocondria e nella stessa mania (Pollini).

Pentandr

Zona

Heracleum Sphondylium L.

Panace, Sedano de' prati

Zona delle valli, collina e montana. — **Località,** prati pingui. — **Provenienza,** non raro ne' prati del Trentino e di tutta l' Italia boreale.

Zona co

Hieracium murorum L.

Geracio silvano

Zona collina, montana e subalpina. — **Località,** ombrosi, incolti e petrosi. — **Provenienza,** comune sui nostri colli a mezzo monte ed ascende anche le alpi; frequente ne' siti imboscati di tutta l'Italia boreale.

Hordeum murinum L.

Orzo selvatico, Spigheta

Zona delle valli e collina. — **Località,** sterili, incolti e lungo le vie. — **Provenienza,** diffusa sul Trentino e in tutta l'Italia.

Zona co
presso la
e nella

Hyssopus officinalis L.

Isopo domestico

Zona collina. — **Località,** aridi e ghiaiosi. — **Provenienza,** nei luoghi sterili di Fontana-santa, in Valsugana, fra Rovereto e Valarsa, presso la Chiusa; rinviensi pur anche nel Friuli presso S. Daniele, Gemona, Tolmezzo e vicinanze, non lungi da Fiume, sul tenere Nizzardo e nella valle Augustana in Piemonte. — **Uso,** questa pianta fu consigliata come espettorante nella tosse e nell'asma; in attualità fu introdotta negli orti.

Lamium Orvala L.

Lamium pannonicum Scop. Orvala lamiodes De Cand.

Lamio Orvala

Zona collina. — **Località,** ombrosi. — **Provenienza,** base di Dos Trento, nelle posizioni settentrionali di Vezzano, di Pergine, presso Sardagna, in Valsugana, presso Stenico, nei colli Berici, sugli Euganei, nel Friuli, ed in genere sul Lombardo, sul Veneto e nel Piemonte.

Lathyrus setifolius L.

Cicerchia capillare

Zona collina. — **Località,** aridi e petrosi. — **Provenienza,** Monte dei Zoccolanti, base di Dos Trento, Piazzina e Gocciadoro, alla base del Baldo, presso Torbole; fu trovata sul colle Urago vicino a Brescia, sul Mantovano presso Volta; questa pianta non sembra diffusa nell'alta Italia.

Gyna

Zona
Lancia
vicina

Listera ovata Rob. Brown.

Ophrys ovata L. Epipactis ovata All.

Orchide di primavera

Zona subalpina e montana. — **Località,** nelle folte macchie. — **Provenienza,** alla base di Chegul sulla montagna di Povo, sulla Lanciada e presso Tione, nei boschi di Sopramonte; fu pur veduta nella selva del Pestrino e presso Marostica, nelle selve di Rivarolo in vicinanza di Genova, nelle adiacenze di Milano, presso Mantova al Bosco Fontana, sui Corni di Canzo al Lario, e sul Bassanese nelle selve di Solagna e d'Angarano.

Zona alpi
Bertoloni le

Lonicera nigra L.

Lonicera salvatica

Zona alpina e subalpina. — **Località,** ombrosi e selve. — **Provenienza,** Paneveggio, Fiemme, Valsugana; pianta molto rara in Italia, Bertoloni la indica soltanto sul monte Gottro nella Liguria orientale, nelle selve alle Terme Valderie in Piemonte, e in Valtrompia sulla provincia bresciana.

Zona mon
Passo Telv

Lunaria rediviva L.

Lunaria perennis Gmel.

Lunaria odorosa, Lunaria maggiore

Zona montana e collina. — **Località**, ombrosi. — **Provenienza**, Suburbano Giovanelli ma rara, sul monte Prima Zuma in Valsugana, presso Telve, in Valstagana, a Pont'arso, nella selva d'Avio, se la indica anche sul Comasco in Valle dolce sopra S. Croce e nelle vicinanze d'Erba al Buco del piombo, per ultimo nei sette Comuni vicentini in Val di Gallio al Buso della Trensena.

Zona mo
gli di Pi

Luzula campestris D. C.

Juncus campestris L.

Bugnamacolo, Giunco secco, Legamane

Zona montana, collina e delle valli. — **Località,** margine dei campi, arenosi, incolti. — **Provenienza,** Gocciadoro, margine dei laghi di Pinè, sui colli di Rovereto, comune sugli Euganei, fu colta nella Liguria orientale presso S. Stefano d'Aveto, sui monti dell' alto Novarese, questa pianta del resto si diffonde in tutta l'Italia.

Convol

Zona, dalla
quelli del
ene pure i

Majanthemum bifolium D. C.

Convallaria bifolia L. Majanthemum Convallaria Wiggers. Smilacina bifolia Desf. Sciophilla convallarioides Wib.

Gramigna di Parnaso del Matth.

Zona, dalla collina alla subalpina. — **Località,** ombrosi. — **Provenienza,** comune nei boschi cedui di mezzomonte e particolarmente in quelli della montagna di Povo, di Bondone, della Scanuccia, del Baldo, e nei medesimi siti nelle valli adiacenti a Trento; questa pianta viene pure indicata nelle alpi di Vieussene nella Liguria occidentale, presso Bormio in Valtellina, sul monte Bisbino nel Comasco, e sul Bassanese nelle selve di Valcrana e di Asiago.

Zona coll

Myosotis intermedia Link.

Centonchio salvatico

Zona collina e delle valli. — **Località,** aridi e incolti. — **Provenienza,** pianta comune nei luoghi arsicci di colle del Trentino ed è diffusa in tutta l'alta Italia.

Zon

Nardus stricta L.

Fieno di monte

Zona alpina e subalpina. — **Località,** pascoli. — **Provenienza,** comune su tutti i pascoli subalpini del Trentino, e così pure popola i prati alti di tutta l'Italia boreale.

Zona
nelle vi

Ophrys muscifera Huds.

Ophrys myodes Swartz

Pecchie

Zona collina e montana. — **Località,** boschetti. — **Provenienza,** non rara fra le macchie di S. Rocco e S. Agata; fu pur trovata nelle vicinanze di Rovereto, e nei boschi vicini a Corè nelle Giudicarie, sul Bassanese sopra Solagna, alle bocche del Lario nei prati presso Crosgalle e al Bosco Fontana sul Mantovano.

Orchis papilionacea L.

Orchis rubra Jacq.

Cipolla cipressina, Cipressini

Zona collina. — **Provenienza,** alla base del colle Venda sugli Euganei, nella selva del Mantico presso Verona, nei prati vicini a Valeggio lungo il Mincio, a Camandoli sul Genovesato e in vicinanza di Torino, sul monte di S. Eutichio presso Como e ai Masi di Val Rovina sul Bassanese.

Orchis globosa L.

Nigritella globosa Reich.

Orchide appendicolata

Zona subalpina ed alpina. — **Località,** prati e ombrosi. — **Provenienza,** montagna di Povo, Bondone, Baldo e Giudicarie; fu colta anche nella selva del Mantico e del Pestrino, sui monti di Solagna, nei prati alti di Marostica, ed in Piemonte.

Orobanche cruenta Bert.

Orobanche vulgaris Gaud., O. caryophyllacea Schultz.

Succiamele sanguigno

Zona collina. — **Località,** petrosi aridi. — **Provenienza,** comune sui colli arsicci e soleggiati del Trentino ; è pianta volgare in tutta Italia e cresce parascita sulle radici dei Citisi, delle Geniste, dei Loti, Edisari e in genere sulle piante della classe diadelfia.

Zone

Orobus niger L.

Orobo silvano

Zona collina e montana — **Località,** boschi cedui. — **Provenienza,** non raro nei boschetti di Gocciadoro, Povo, Sardagna e alle falde dei monti di Rovereto e di Monte Baldo ; gli autori lo indicano diffuso nei siti ombrosi di tutta l'alta Italia.

Oxytropis montana D. C.

Astragalus montanus L. Phaca montana Crantz.

Astragalina montana

Zona alpina e nivale. — **Località,** pascoli. — **Provenienza,** prati alti di Bondone, Fierozzo, Baldo, Spinale e Scanuccia; questa pianta è propria si delle formazioni calcaree che piriche; fu anche trovata sul Cenisio e nella Savoia, sui monti Rosa, Mandello, Codeno e Generorso, sul monte Cavallo nel Belunese, e presso Portole sul Vicentino.

Pent

Atha

ona mor
ovato nell

Peucedanum Cervaria Lap.

Athamanta Cervaria L. Ligustrum Cervaria Spreng. Selinum Cervaria Crantz.

Cervaria, Selino nero

Zona montana e collina. — **Località,** aridi e petrosi. — **Provenienza,** lungo tutta la base calcarea di Povo e di Calispert, e fu anche trovato nelle Giudicarie e presso Brentonico, se l'accenna pur anche nella Liguria orientale sui monti del Bracco; sui colli di Genova, nei prati montani del Bassanese e nelle selve di S. Eusebio d'Angarano.

Zona niva
alle di Fie

Pedicularis recutita L.

Pedicolare alata

Zona nivale. — **Località,** ombrosi umidi. — **Provenienza,** Colbricon in Paneveggio, verso la metà del giogo ne' siti opachi, e nella valle di Fiemc; l' Allioni la segna nei prati alpini del Piemonte e della Savoia specialmente sul monte Echellier e nei prati umidi del monte S. Bernardo: questa pianta sembra molto rara nell' alta Italia.

gamia

Zona su

Pedicularis tuberosa L.

P. gyroflexa Vill. P. adscendens Hopp. et Sterenb.

Pedicolare tuberosa

Zona subalpina. — **Località,** prati umidi. — **Provenienza,** Bondone, Baldo, Gazza, Spinale, monti del Trentino: trovasi ancora sui monti Veronesi e di Belluno, nel Friuli e nel Piemonte.

Zona alpin
comune sul s
a Ceredol e

Phiteuma hemisphaericum L.

Raponzolo Gramignola

Zona alpina e nivale. — **Località,** graminosi e pascoli. — **Provenienza,** preferisce il suolo porfirico, granitico e micaschistoso, men comune sul suolo calcareo. Trovasi ne' pascoli alti di Fierozzo, sulla Costonzella di Paneveggio, in Pinè, e sulle giogaie di Peio; nelle Giudicarie a Ceredol e Cengledino e in Cima d' Asta. Abita anche il Cenisio e le alpi piemontesi di Vaudier, ascende il Monte Rosa, trovasi per ultimo in Valtellina e sul Bresciano al sommo del monte Cigoletto.

Zer

Poa bulbosa L.

Fienarola scalogna

Zona collina. — **Località,** aridi. — **Provenienza,** diffusa su tutti i colli arsicci del Trentino, e dell'Italia settentrionale e popola copiosa i lidi di Genova.

Zon
Sarda

Potentilla rupestris L.

Fragolaccia rupina

Zona, dalla zona collina alla subalpina. — **Località,** petrosi. — **Provenienza,** preferisce le roccie cristalizzate, Gocciadoro e prati di Sardagna, Valsugana e Giudicarie; copiosa sui colli Euganei, fu trovata sulle rupi vicine a Nizza, nei luoghi sassosi delle terme Valderie, a Confienza nella Lomellina, nelle selve d'Origgio sul Milanese, e sul monte S. Eutichio presso Como.

Zona
presso

Potentilla argentea L.

Cinquefoglio bianco

Zona collina. — **Località,** aridi e petrosi. — **Provenienza,** diffusa sui colli arsicci di Gocciadoro e di Mesiano, sui colli di Rovereto, presso Cavalese e Valsugana, se la nota in Piemonte sulle rupi delle terme Valderie, nelle vicinanze di Torino e di Mantova e sul Triestino.

Zona, da
e delle val

Primula acaulis L.

Primula vulgaris Smith. P. grandiflora Lmk. P. sylvestris Scop.

Primavera minore

Zona, dalla collina alla nivale. — **Località,** ombrosi. — **Provenienza,** al settentrione dei colli di Trento, in Piazzina, Gocciadoro, e nelle valli delle Giudicarie, in Valsugana e Vallarsa, pianta in massima diffusa sul Trentino, non così nel Lombardo-Veneto, quantunque discenda sparsa nella bassa Italia popolando gli stessi boschi di Sicilia.

Zona co
ngo il r

Prunella alba Pall.

Brunella

Zona collina. — **Località,** incolti e margine dei campi. — **Provenienza,** Gocciadoro, S. Rocco, nella valle Capriana, nei prati aridi e lungo il margine delle fosse di Roman sul Bassanese, ai lidi veneti presso Brondolo, Cavallino e Campalto, sul monte di S. Eutichio presso Como, nella Liguria orientale sul pendio di S. Anna, questa pianta è sparsa ma non diffusa in tutta l' Italia boreale.

Zona
Rovereta
tanto al

Prunus Cerasus L.

Ciliegio selvatico

Zona montana (spontaneo). — **Località,** boschi. — **Provenienza,** s' incontra quà e là spontaneo nei boschi di Pinè e del Baldo, sul Roveretano e nelle valli vicine a Trento, sul Veronese, Bassanese e Monte Rosa. — **Uso,** questa pianta, chè coltivata prospera sul Trentino tanto al piano che al colle, somministra il frutto che sia acidulo dolce od amarognolo si presta tanto ad uso domestico, quanto farmaceutico, ed il legno si presta all' elegante costruzione di mobili da stanza.

sandria

Zona m
di Bo

Sorbus aucuparia L.

Pyrus aucuparia Gärtn.

Sorbo salvatico, Corbellaro silvestre, Sorba ottobrina

Zona montana e subalpina. — **Località,** boschi cedui. — **Provenienza,** s'intromette nei boschi a foglia larga di Povo, della Scanuccia, di Bondone, non è raro sulle formazioni calcaree del Trentino e della catena delle Alpi e discende anche oltre Pò nella media Italia.

R/

Rhinantus maior Ehrh.

Rhinanthus Crista galli L. Alectorolophus grandiflorus Vallr. A. maior Reich.

Corona di Re, Cresta di gallo

Zona delle valli. — **Località,** prati. — **Provenienza,** comune nelle praterie del Trentino e dell' Italia boreale.

ondria

Zona suba
qua si tut
presso Borm

Rhododendron hirsutus L.

Rododendro peloso

Zona subalpina ed alpina. — **Località,** ingombra le mughiere e forma da se solo siepaie, preferisce il suolo calcareo. — **Provenienza,** su quasi tutte le formazioni calcaree che circondano il bacino di Trento, non che sui monti di Rovereto, della Valsugana e Giudicarie, fu visto presso Bormio in Valtellina, sui monti presso il Lario, in Valstagna sul Bassanese, sui monti di Portole nel Vicentino, sul Bergamasco, nel Friuli e sul Novarese.

Salvia pratensis L.

Cavolaccio, Chiarella, Erba Lupa, Latugaccio, Ormino,

Zona delle valli e collina. — **Località,** prati. — **Provenienza,** comune ne' prati del Trentino e di tutta l' alta Italia.

gia mo

Zona c
di Sella,

Salvia glutinosa L.

Salvia montana, Salvia glutinosa

Zona collina. — **Località,** ombrosi. — **Provenienza,** Oltrecastello nei boschi del Fersina, nella Valsugana, in Val di Sole, in Val di Sella, e in genere fu trovata in tutte le valli del Trentino; cresce pure sui colli veronesi, vicentini, bresciani e negli Euganei, nel Friuli nel Piemonte e nella Liguria.

Zona

Sanicula europaea L.

Sanicula vulgaris Koch, Astrantia Diapensia Scop.

Diapensia, Erba fragolina

Zona montana e collina. — **Località,** ombrosi umidi. — **Provenienza,** presso S. Rocco, nella Valsugana e nelle Giudicarie alle Stelle; non è in genere pianta rara in Italia, se l'accenna nella Liguria occidenlale in vicinanza di Pegli, sul Bergamasco, sul Mantovano al Bosco Fontana, e sul Bassanese nelle selve di S. Michele d'Angarano.

Zona mo
presso Pra

Scirpus sylvaticus L.

Giunco pannocchiuto

Zona montana. — **Località,** prati umidi, al margine dei boschi. — **Provenienza,** erbosi di Povo e Pinè, fu trovato nelle Giudicarie presso Prada e in Valsugana; nasce pure nel Friuli, in Campo Marzio e a S. Pancrazio presso Verona, nelle selve umide lungo l'Adige e il Mincio, sul tenere di Padova e Pavia, nè manca in Piemonte.

Scorzonera grandiflora Lapey

Scorzonera aristata Ramond. S. Hoppeana Sieb. S. alpina Hoppe

Scorzonera a fior grande

Zona alpina. — **Località,** pascoli. — **Provenienza,** Scanuccia e Paneveggio, Durone di Fassa (Facchini), Valsugana presso Roncegno (Ambrosi), pianta poco conosciuta nell' Italia settentrionale.

Zon
vicin

Serapias Pseudo--cordigera Moiricand.

Serapias longipetala Poll.

Satirio incapucciato

Zona, collina e montana. — **Località,** prati pingui. — **Provenienza,** presso Vigolo, in Valsugana, a Telve, vicino a Castellano, nelle vicinanze del Garda a Lazise, Peschiera e Monte Serva; Bertoloni la indica frequente nei prati montani d'Italia, sui colli di Marassi a Genova, nell'Insubria svizzera presso Melide a Laggero e nei prati montani presso Como.

Sesleria coerulea Ardui.

Cynosurus coeruleus L.

Codino azzurro, Codino argentino

Zona collina. — **Località,** petrosi. — **Provenienza,** frequentissima alle falde dei monti e dei colli del Trentino e diffusa in tutta l'alta Italia.

Zona
a Porta
alle rad
sulle gi

Silene Saxifraga L.

Silene rupina

Zona collina. — **Località,** petrosi. — **Provenienza,** rupi settentrionali di Dos Trento e sulla facciata interna delle mura di Trento a Porta nova, in val di Sella, sul Montalon, nelle Giudicarie sulla Lanciada, e sulle Vette feltrine; fu pur raccolta nella Insubria Elvetica alle radici del monte S. Salvatore presso Lugano, nella Liguria occidentale sulle rupi del torrente Varenna in vicinanza di Pegli, in Piemonte sulle giogaie delle Mocchie, in Valsassina presso il Buco del piombo, ai Corni di Canzo e sul monte Lampino presso Como, sul monte Baro al Leco, e sulle vecchie mura di Solagna nel Bassanese.

Zona
anche
sul mo

Silene acaulis L.

Ocimoide moscoso

Zona nivale, — **Località**, tappezza e forma zola sul vertice dei gioghi. — **Provenienza**, Bondone, Scanupia, Baldo, e fu trovata anche in Fiemme e nella Valsugana. Gli autori la segnano pure in Valtellina, sul monte Legnone al Lario, in Valmeria sopra Mandello, sul monte Codeno presso Leco, sul Blemone nella provincia bresciana, nella valle Saviore sul Bergamasco, lungo le giogaie d'Agordo e nel Friuli.

Zona

Solidago Virga aurea L.

Erba giudaica, Erba da pesci, Erba pagana, Verga aurea

Zona dalla collina alla nivale. — **Località,** aridi, incolti e ghiaiosi. — **Provenienza,** su tutti i colli di Trento, e mutando abito sale le alte giogaie; è pianta volgare nei colli e nelle selve dell'alta Italia.

Spirea Aruncus L.

Barba Capri

Zona montana e subalpina. — **Località,** boschetti cedui, lungo i rivi e le sorgenti. — **Provenienza,** Oltrecastello, Povo, Vigolo, monte Baldo, monti presso Rovereto, Valsugana, Fassa, e nei monti bresciani, veronesi, vicentini, nel Friuli e nel Piemonte.

lessandria

Zona c
e delle

Spiraea Filipendula L.

Erba peperina, Trina di Fiandra

Zona collina e montana. — **Località,** prati aridi. — **Provenienza,** prati di Terlago, d' Oltrecastello e della Naunia, di Rovereto e delle Giudicarie; fu vista nei boschi di Buffalora lungo il Ticino, nella selva del Mantico nel Veronese e sui colli d' Angarano nel Bassanese.

Poly

Zona sub
adiacenti a

Thalictrum aquilegifolium L.

Talittro colombino

Zona subalpina. — **Località,** ombrosi e prati. — **Provenienza,** non raro sulle alture di Bondone, del Baldo, di Gazza e delle valli adiacenti al bacino di Trento; se lo indica pure nella Liguria orientale sul monte Gottro e nella occidentale sulle giogaie di Scaggia al Prato ratado, nelle selve presso le terme Valderie in Piemonte e sul Cenisio.

Sygenesi

Zona d
settentri

Tragopogon pratensis L.

Barba di Becco, Salsefrica, Salsifino

Zona delle valli. — **Località,** prati. — **Provenienza,** comune sul Trentino non che nei luoghi erbosi e nei prati di tutta l'Italia settentrionale. — **Uso,** la radice di questa pianta lattiginosa ed amara fu riconosciuta giovevole per la tosse; ma ora a giudizio di Bertoloni è trasandata a torto.

Zona, da q
e d

Trifolium pratense L.

Amaranto salvatico, Capo rosso, Moscino, Trifoglio da prato

Zona, da quella delle valli ascende alla nivale. — **Località,** prati. — **Provenienza,** diffuso nei prati e luoghi erbosi di tutto il Trentino e dell' Italia settentrionale. — **Uso,** quest' erba s' intromette con profitto nei prati artificiali qual salubre pabulo agli animali.

Zona c
el Ga

Trifolium rubens L.

Trifoglio rosseggiante

Zona collina. — **Località,** ombrosi, petrosi. — **Provenienza,** boschetti di Gocciadoro, di Sprè, di S. Bartolomeo, nelle Giudicarie, al Garda, alla base del Baldo, e cresce copioso sui colli Euganei, veronesi, e vicentini e sui bassi monti di tutta l'Italia boreale

Trifolium arvense L.

Piè di Lepre, Lagopo micino, Moscino

Zona collina. — **Località,** aridi e arsicci. — **Provenienza,** Gocciadoro, Dos Trento e sui colli snudati di Rovereto ; è pianta volgare fra i seminati e ne' luoghi sterili di tutta l'alta Italia.

Syng

Zona d
– Pro
esterr

Tussilago Farfara L.

Farfaro o Tussilagine

Zona delle valli, collina e montana. — **Località,** lungo i ruscelli, sui declivi bagnati, fra le ghiaie dei torrenti; ama il suolo argilloso. — **Provenienza,** comune in tutta l'alta Italia. — **Uso,** questa pianta di sapore amaro e contenente molta mucilagine fu suggerita all'esterno qual ammoliente; il decotto della stessa ed il succo estratto in primavera fu usato in antico nelle malattie di petto, nelle tossi catarrali e nella tabe.

Valeriana tripteris L.

Nardo montano trifogliato

Zona montana e subalpina. — **Località,** petrosi. — **Provenienza,** è frequente a mezz' alpe e fra i fessi delle rupi di Bondone e di Povo, in Valsugana e nelle Giudicarie, fu anche trovata sul Apennino della Liguria occidentale alla Scaggia, e nell' orientale sul monte Gottro e sulle alpi piemontesi alla Madonna delle Finestre.

Zona c
comune

Vinca minor L.

Pervinca minor Scop.

Erba Vinca, Fior da morto, Pervinca

Zona collina. — **Località,** boschetti e petrosi. — **Provenienza,** comune sui colli di Gocciadoro e sulle roccie vicine a Trento; pianta comune nelle siepi e nelle selvette d' Italia. — **Uso,** se è fresca si presta come evacuante, secca come astringente; una volta s' impiegava nei gargarismi ma ora è trasandata.

Viola canina L.

Viola mammola inodore

Zona montana e subalpina. — **Località,** ombrosi e margine dei boschi. — **Provenienza,** comune su tutti i monti che circondano il bacino di Trento e Rovereto; e comune in tutta l' Italia boreale.

DI

FLORA
DELL' ITALIA SETTENTRIONALE E DEL TIROLO MERIDIONALE

INDICE

alfabetico e zonale delle piante contenute nella Centuria Seconda

Achillea Millefolium L.	. . .	Zona delle valli e collina
Aethionema saxatile R. Brow.	. .	» collina e montana
Agrimonia Eupatorium L.	. . .	» delle valli e collina
Alchimilla pubescens M. B.	. .	» subalpina
Alnus viridis D. C. fl.	. . .	» subalpina e alpina
» glutinosa Gaertn.	. . .	» delle valli
Alyssum calycinum L.	. . .	» collina
Alsine rostrata Kock	. . .	» alpina e subalpina
» recurva Wahlen.	. . .	» nivale e alpina
Anemone alpina L.	. . .	» alpina e subalpina
» Hepatica L.	. . .	» collina e montana
» narcissiflora L.	. . .	» nivale
Anthemis arvensis L.	. . .	» delle valli
Anthoxanthum odoratum L.	. .	» delle valli e collina
Aronia rotundifolia Pers.	. . .	» collina e montana
Astragalus mospessulanus L.	. .	» collina e montana
Astrantia major L.	. . .	» collina e montana
Bonjeania hirsuta Rchb.	. . .	» collina e montana
Bupleurum stellatum L.	. . .	» nivale
Calluna vulgaris Salisbury	. . .	» montana e subalpina
Campanula rapunculoides L.	. .	» collina
Cardamine amara L.	. . .	» delle valli
» resedifolia L.	. . .	» alpina e subalpina
Carex Oederi Retz.	. . .	» montana
» fuliginosa Schkuhr.	. . .	» nivale
Carlina acaulis L.	. . .	» collina e montana
Caucalis daucoides L.	. . .	» collina
Centaurea Cyanus L.	. . .	» collina e delle valli
Cirsium arvense Scop.	. . .	» delle valli
» pannonicum Gaud.	. . .	» montana e subalpina
Colutea arborenscens L.	. . .	» collina e montana
Cornus sanguinea L.	. . .	» collina
Coronilla varia L.	. . .	» collina e delle valli
» Emerus L.	. . .	» collina
Cynanchum Vincetoxicum R. Brow.	.	» collina
Cytisus hirsutus L.	. . .	» collina e montana
» alpinus Mill.	. . .	» montana e subalpina
» radiatus Koch.	. . .	» subalpina
Dictamnus Fraxinella Pers.	. .	» collina
Dryas octopetala L.	. . .	» alpina
Epilobium Dodonai Vill.	. . .	» dalla collina alla glaciale
Erica carnea L.	. . .	» collina e montana
Eringium ametistinum L.	. . .	» collina
Festuca ovina L.	. . .	» dalla collina alla nivale

Fumaria officinalis L.	Zona	collina
Geum rivale	»	subalpina
Heleborus niger L.	»	montana
Heracleum Sphondylium L.	»	delle valli, collina e montana
Hieracium murorum L.	»	collina, montana e subalpina
Hordeum murinum L.	»	delle valli e collina
Hyssopus officinalis L.	»	collina
Lamium Orvala L.	»	collina
Lathyrus setifolius L.	»	collina
Listera ovata R. Brow.	»	subalpina e montana
Lonicera nigra L.	»	alpina e subalpina
Lunaria rediviva L.	»	montana e collina
Luzula campestris D. C.	»	montana, collina e delle valli
Majanthemum bifolium D. C.	»	dalla collina alla subalpina
Myosotis intermedia Link.	»	collina e delle valli
Nardus stricta L.	»	alpina e subalpina
Ophrys muscifera Huds.	»	collina e montana
Orchis papilionacea L.	»	collina
» globosa L.	»	subalpina ed alpina
Orobanche cruenta Bertol.	»	collina
Orobus niger L.	»	collina e montana
Oxytropis montana D. C.	»	alpina e nivale
Peucedanum Cervaria Lap.	»	montana e collina
Pedicularis recutita L.	»	nivale
» tuberosa L.	»	subalpina
Phiteuma hemisphaericum L.	»	alpina e nivale
Poa bulbosa L.	»	collina
Potentilla rupestris L.	»	dalla collina alla subalpina
» argentea L.	»	collina
Primula acaulis L.	»	dalla collina alla nivale
Prunella alba Poll.	»	collina
Prunus Cerasus L.	»	montana
Sorbus aucuparia L.	»	montana e subalpina
Rhinantus maior Ehrh.	»	delle valli
Rhododendron hirsutus L.	»	subalpina e alpina
Salvia pratensis L.	»	delle valli e collina
» glutinosa L.	»	collina e montana
Sanicula europaea L.	»	montana e collina
Scirpus sylvaticus L.	»	montana
Scorzonera grandiflora Lapey	»	alpina
Serapias Pseudo-cordigera Moricand	»	collina e montana
Sesleria coerulea Ardui.	»	collina
Silene Saxifraga L.	»	collina
» acaulis L.	»	nivale
Solidago Virga aurea L.	»	dalla collina alla nivale
Spiraea Aruncus L.	»	montana e subalpina
» Filipendula L.	»	collina e montana
Thalictrum aquilegifolium L.	»	subalpina
Tragopogon pratensis L.	»	delle valli
Trifolium pratense L.	»	da quella delle valli ascende alla nivale
» rubens L.	»	collina
» arvense L.	»	collina
Tussilago Farfara L.	»	delle valli, collina e montana
Valeriana tripteris L.	»	montana e subalpina
Vinca minor L.	»	collina
Viola canina L.	»	montana e subalpina